

Cyclandelat
3M Medica Natil

Zus: -Kapseln: 1 Kaps. enth.: Cyclandelat 400mg. Hilfsst.:
Carmellose-Na, Farbst.: E 104, E 122, E 171, Gelatine,
Magnesiumcarbonat, Magnesiumstearat, Methylcellulose,
Siliciumdioxid.

Anw: Zerebrale Durchblutungsstör.; Hochdruckenzephalopathie,
prophylakt. Langzeitbehandl. apoplektischer Episoden, postapo-
plektische Behandl. (ohne Hämorrhagie), transitorische ischämi-
sche Anfälle, Hemiparese, bilaterale Parese, Sprachstör., Laby-
rintherkrank., Schwindel u. perzeptive Taubheit, Intervallbehandl.
bei Migräne u. Spasmen der Retinagefäße (Retinopathia angio-
spastica).

Gegenanz: Akute Phase eines apoplektischen Insults. Obwohl bei
therapeut. Dos. keine Verlängerung der Blutungszeit beim Men-
schen festgestellt wurde, sollten Pat. mit Neigung zu Blutungen
während der Therapie beobachtet werden. Vorsicht ist geboten
bei Glaukom-Pat.

Schwangersch: Kontraindiziert.

Nebenw: Exanthem. B. sehr hoher Dos. vereinzelt Parästhesien
(z.B. Prickeln, Kribbeln) in den Extremitäten, Erröten, leichte
Übelk., die Nebenw. verschwinden b. Reduz. d. Dos.

Dos: Initialbehandl.: 3-5x tgl. 1 Kaps., Langzeitbehandl. 2-3x tgl. 1
Kaps. unzerkaut m. etw. Flüssigk.

Pack:

2